



- 01** 수술 후 3일 동안은 부기나 멍이 생기며 그 이후부터는 점차 빠지게 됩니다.
- 02** 수술 후 2~3일간 음식을 씹을 때 수술 부위가 당기거나 아플 수 있습니다.
- 03** 수술 후 2~3일 정도는 냉찜질을 해주는 것이 좋습니다. 냉찜질을 하실 때에는 수술 부위에 얇은 수건이나 손수건을 먼저 댄 후, 병원에서 제공하는 Ice-pack을 그 위에 올리고 찜질을 해주시면 됩니다.
- 04** 수술 후 붙인 붕대, 반창고, 테이프 등은 절대로 임의로 떼어내거나 제거하시면 안됩니다.
- 05** 수술 전에 복용하시던 혈액순환 개선제, 건강 보조제 등은 출혈을 일으킬 수 있으므로 수술 후 1주가 경과한 후부터 드시기 바랍니다.
- 06** 수술 후 2개월까지는 마사지 및 고주파 온열치료 등을 피하셔야 합니다.
- 07** 가벼운 산책을 제외한 에어로빅, 헬스 등의 강한 운동은 수술 후 4주가 경과한 후부터 하시는 것이 좋습니다.
- 08** 수술 부위를 제외한 간단한 샤워는 수술한 다음 날부터 가능하지만, 수술 부위에 물이 닿지 않게 주의하고, 목욕탕, 찜질방, 사우나 등은 수술 후 4주가 경과한 후부터 이용하셔야 합니다.
- 09** 진통제나 항생제는 병원에서 처방한 것만 드시면 됩니다. 진통제가 추가로 필요한 경우에는 아스피린 성분이 없는 타이레놀을 드시면 됩니다. 진통제 중 아스피린 계통은 출혈을 일으킬 수 있으므로 드시지 않아야 합니다.
- 10** 술과 담배는 반드시 수술 후 4주가 경과한 후부터 하셔야 합니다. 술은 염증을 유발할 수 있으며, 담배는 혈관을 수축시켜 피부를 손상 및 괴사시키거나 수술 부위의 상처 치유를 매우 지연시킬 수 있습니다.
- 11** 퇴원 후 발생하는 궁금하신 사항이나 혹은 긴급상황이 발생할 경우 병원(TEL 1588-5153)으로 직접 전화 주시기 바랍니다.